

INSEKTICIDAI (augalų apsaugos produktai kenkėjams naikinti)

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			Pastabos
					preparato kiekis ml,g/10 l vandens	Karencijos laikotarpis	Didžiausias apdorojimų skaičius	
1	Actara 25 WG Syngenta Crop Protection AG, 0183I/08, 2018-07-17	Tiametoksamas 250 g/kg	Bulvės	Purškama prieš kolorado vabalus, amarus kenkėjų plitimo pradžioje	2 g 10 l vandens	14	1	
			Obelys, kriaušės	Purškama prieš amarus, obelinius žiedgraužius kenkėjų plitimo pradžioje	2-4 g /10 l vandens	14	1	
			Dekoratyviniai augalai šiltnamiuose	Purškama prieš šiltadaržinius baltasparnius, vakarinius tripsus kenkėjų plitimo pradžioje	4-8 g/ 10 l vandens (0,04-0,08% tirpalu)		1	
			Dekoratyviniai augalai šiltnamiuose	Purškama prieš amarus kenkėjų plitimo pradžioje	2 g/ 10 l vandens (0,02 tirpalu)		1	
2.	Decis mega	Deltametrinas 50 g/l	Žirniai, pupos	Žirniniai	4 ml/10 l	20	2	

	Bayer CropScience AG 0336I/07 2017-12-17			amarai, pupiniai amarai, žirniniai vaisėdžiai, gumbeliniai straubliukai	vandens			
			Bulvės	Kolorado vabalai	4 ml/10 l vandens	20	2	
			Gūžiniai ir žiediniai kopūstais, brokoliai, griežčiai	Baltukai, kryžmažiedės spragės, kopūstinius pelėdgalvius, amarus	4 ml/10 l vandens	14	2	
			Morkos	Morkinės musės	4 ml/10 l vandens	30	2	
			Dekoratyviniai augalai	Cikadelės, amarai	4 ml/10 l vandens		2	
			Obelys, kriaušės	Amarai, lapsukiai, obeliniai žiedgraužiai, obuoliniai vaisėdžiai, pjūkleliai	4 ml/10 l vandens	30	2	
3.	NeemAzal T/S Trifolio M GmbH, 0240I/02, 2011-12-31	Azadirachtinas A 10 g/l	Pomidorai šiltnamiuose	Purškama prieš amarus, tripsus, baltasparnius, voratinklines erkes	Purškama 0,5% tirpalu		3	
			Agurkai paprika, dekoratyviniai augalai šiltnamiuose	Purškama prieš amarus, tripsus, baltasparnius, voratinklines erkes	Purškama 0,5% tirpalu		3	
			Kopūstai	Purškama prieš baltukus, pelėdgalvius	Purškama 0,5% tirpalu		3	

4.	Mavrik 2F Makhteshim-Agan Holland B.V. 0330I/07 2011-12-31	Tau- fluvalinatas 240 g/l	Bulvės	Naikina kolorado vabalų lervas	5 ml/10 l vandens	14	1	
			Morkos	Naikina morkines blakutes	5 ml/10 l vandens	14	2	
5.	Vertimec 018 EC Syngenta Crop protection AG, 0307I/07, 2012-12-31	Abamektinas 18 g/l	Obelys	Raudonosios ir rausvosios sodinės erkės	Purškiama gausiai išplitus kenkėjams 15 ml 10 l vandens.	28	2	
			Braškės	Paprastosios voratinklinės ir žemuoginės erkės	Pirmą kartą purškiama prieš žydėjimą, antrą – po derliaus nuėmimo 12 ml 10 l vandens	3	2	
			Agurkai šiltnamiuose	Paprastosios voratinklinės erkės, šiltnaminiai baltasparniai, minamusės, tripsai	12 ml 10 l vandens	3	3	
			Dekoratyviniai augalai šiltnamiuose	Paprastosios voratinklinės erkės, šiltnaminiai baltasparniai, minamusės, tripsai	12 ml 10 l vandens		3	

FUNGICIDAI (augalų apsaugos produktai augalų ligoms naikinti)

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			Pastabos
					preparato kiekis ml,g/10 l vandens	Karencijos laikotarpis	Didžiausias apdorojimų skaičius	
1.	Champion 50 WP Nufarm UK Limited, 0262F/04, 2014-05-31	Vario hidroksidas 77% (500 g/kg vario)	Obelys	Purškiama prieš rauples. Ankstyvasis sodų purškimas iki vegetacijos pradžios prieš pumpurų brinkimą.	50 g preparato 10 l vandens (0,5% tirpalu)	7	1	
			Bulvės	Purškiama prieš bulvių marą, sausligę	63 g preparato 10 l vandens (1 arui bulvių nupurkšti reikia 25 g preparato, 4 l tirpalo)	7	4	
2.	Chorus 75 WG Syngenta Crop Protection AG, 0120F/03, 2011-04-30	Ciprodinilas 750 g/kg	Obelys, kriaušės	Purškiama prieš rauples, moniliozę	2	20	3	
3.	Effector WG BASF A/S, 0147F/04, 2011-12-31	Ditianonas 700 g/kg	Obelys	Purškiama prieš rauples, filostiktozę, paprastąjį obelų vėžį, rūdis, rudąjį	5–10	20	6	

				puvinį				
			Kriaušės	Purškiama prieš rauples, rūdis, degligę	5–10	20	6	
			Vyšnios, trešnės	Purškiama prieš kokomikozę, rauples, moniliozę, vaisių puvinį, šratligę	5–10	20	4	
			Slyvos	Purškiama prieš šratligę, rūdis, moniliozę	5–10	20	4	
			Juodieji ir raudonieji serbentai, agrastai	Purškiama prieš šviesmargę, degulius, rūdis, miltligę	5–10	20	4	
			Avietės	Purškiama prieš degulius, žievėplaišą, šviesmargę, rūdis, pilkajį puvinį	5–10	20	4	
4.	Gloria Bayer CropScience AG , 0290F/06, 2016-03-25	Fenamidonas+ propamokarbo hidrochloridas 75 + 375 g/l	Bulvės	Purškiamos vegetacijos metu, kai susidaro palankios sąlygos marui, sausligei plisti, bet ne vėliau kaip pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams	20 ml/a	7	3	
5.	Infito SC 687,5	Propamokarbo hidrochloridas+	Bulvės	Purškiama vegetacijos	30-40 ml/10 l	7	4	

	Bayer Crop Science atstovybė Baltijos šalims 0337F/07, 2011-11-30	fluopikolidas 625+62,5 g/l		metu nuo maro	vandens, ir nupurkšti 250 m ²			
			Agurkai, auginami lauke	Purškiama vegetacijos metu nuo netikrosios miltligės	40 ml/10 l vandens ir nupurkšti 250 m ²	3	3	
			Agurkai, auginami šiltnamiuose	Purškiama vegetacijos metu nuo netikrosios miltligės 0,14% tirpalo	14 ml/ 10 l vandens	1	3	
			Gūžiniai, žiediniai ir lapiniai kopūstai	Purškiama vegetacijos metu nuo netikrosios miltligės	30 ml/10 l vandens ir nupurkšti 170 m ²	14	3	
			Porai	Purškiama vegetacijos metu nuo netikrosios miltligės	30 ml/10 l vandens ir nupurkšti 170 m ²	14	2	
6.	Previcur 607 SL Bayer Crop Science atstovybė Baltijos šalims, 0065F/06, 2016-03-25	Propamokarbas 607 g/l	Kompostas ir kiti substratai	Dezinfekcija prieš pašaknio ir šaknų puvinius	300-400 ml preparato 20 l vandens 1 m ³ substrato			
			Agurkų, pomidorų ir kopūstų daigai	Laistoma 0,15% tirpalu prieš pašaknio ir šaknų puvinius				

			Auginiai	Mirkoma 0,15 % tirpale 15–20 minučių prieš pašaknio ir šaknų puvinius				
			Gėlių svogūnėliai	Mirkoma 0,3 % tirpale 15–20 minučių prieš pašaknio ir šaknų puvinius				
			Spygliuočių ir lapuočių medžių sodmenys	Laistoma 0,15–0,3 % tirpalu prieš infekcinį nykimą				
			Agurkai šiltnamiuose	Purškiama prieš netikrąją miltligę 0,25% tirpalu		3		3
			Agurkai lauke	Purškiama prieš netikrąją miltligę	20-40 ml 1 arui (išpurškiant 8-10 litrų tirpalo 1 arui)	5		3
			Pomidorai šiltnamiuose	Purškiama prieš marą 0,25% tirpalu		5		2
			Dekoratyviniai augalai	Laistoma 0,15-0,3% tirpalu nuo pašaknio ir šaknų puvinų				

			Dekoratyvieniai augalai	Purškiama pasirodžius pirmiesiems netikrosios miltligės požymiams 0,15% tirpalu			3	
7.	Previcur Energy Bayer CropScience AG 0356F/08 2018-10-17	Propamokarbas 530 g/l + fosetilas 310 g/l	Substratas daržovių, dekoratyvinių augalų auginimui	Naudojamas 1,25 % (2,5 ml/200 ml vandens) tirpalas. Saugo nuo šaknų puvinų (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phoma spp., Phytophthora spp., Alternaria spp)			1	
			Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų, brokolių, briuselinių kopūstų, salotų daigai	Laistoma 0,15% tirpalu. Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjų Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.)	15 ml/10 l vandens ir palaistyti 5 m ²	2		

			Dekoratyviniai augalai	Laistoma 0,2% tirpalu. Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinių sukėlėjų (Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.)	20ml/10 l vandens ir palaistyti 5 m ²		2	
			Dekoratyviniai augalai	Saugo nuo netikrosios miltligės (Peronospora spp., Bremia spp.)	25 ml/100 m ²		2	
8.	Revus 250 SC Syngenta Crop Protection AG 0345F/08 2011-06-29	Mandipropamidaz 250 g/l	Bulvės	Saugo bulves nuo maro	6 ml/a	3	3	
			Pomidorai auginami lauke ir šiltnamiuose	Saugos pomidorus nuo maro	6 ml/a	3	3	
9.	Score 250 EC Syngenta Crop Protection AG, 0047F/00, 2012-12-31	Difenkonazolas 250 g/l	Obelys, kriaušės	Purškiama prieš rauples alternariozę, gleivėtrūdes	2	20	4	
10	Topas 100 EC Syngenta Crop Protection AG, 0049F/07 2014-06-30	Penkonazolas 100 g/l	Agurkai lauke	Purškiama prieš miltligę	2,5 (0,025%)	20	2	
			Agurkai šiltnamiuose	Purškiama prieš miltligę	2,5 (0,025%)	3	2	
			Juodieji	Purškiama	5 (0,05%)	20	2	

			serbentai, agrastai	prieš tamsiąją miltligę				
			Vyšnios	Purškiama prieš kokomikozę	5 (0,05%)	20	2	
			Avietės	Purškiama prieš pilkaji puvinį, žievėplaišą	5 (0,05%)	20	2	
			Dekoratyviniai augalai	Purškiama prieš miltligę ligai pasireiškus	5 (0,05%)		2	

HERBICIDAI (augalų apsaugos produktai piktžolėms naikinti)

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			Pastabos
					preparato kiekis ml,g/10 l vandens	Karencijos laikotarpis	Didžiausias apdorojimų skaičius	
1.	Banvel 4S Syngenta Crop Protection AG, 0007H/05, 2015-05-31	Dikamba 480 g/l	Vejos	Naikina burnočius, balandas, ramunes, dirvinius ridikus, žliūges, gysločius, rūgštynes, kiaulpienes	10 ml apdorojant 1-2 arus		1	

2.	Betanal Bayer CropScience AG 0355H/08 2018-10-17	Fenmedifamas 160 g/l	Derančios braškės	Purkšti anksti pavasarį iki braškių žydėjimo, po tarpueilių purenimo, ant ką tik sudygusių piktžolių arba po derliaus nuėmimo, po tarpueilių purenimo ant naujai sudygusių piktžolių 3 kartus po 20 ml/arui arba 2 kartus po 30 ml/arui produkto, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje.	60 ml/arui		3	
			Naujai įveistos braškės	Purkšti praėjus vienai savaitei po daigų pasodinimo 30 ml/arui, purškimą pakartoti pasirodžius naujai piktžolių bangai, naudojant 30 ml/arui.	60 ml/arui		2	
3.	Dalgis Monsanto Crop Science Danmark A/S, 0235H/06, 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių, uogakrūmių pomedžiai	Naikina daugiameses ir vienmeses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius ir	150 ml apdorojant 500 m ²		1	

			uogakrūmius			
		Plotai, skirti sodų ir uogynų įveisimui	Naikina daugiamešes ir vienmešes vienaskiltes ir dviskiltes piktžolės. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai jos turi 3-4 lapus arba yra 10-12 cm aukščio	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1
		Gėlynai, vejės	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. <i>Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų.</i>	1 dalis Dalgis ir 3 dalys vandens		1
		Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Purškama po derliaus nuėmimo. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai varpučiai 10-20 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiamešės dviskiltės - skrotelės stadijoje. <i>Po purškimo 5 dienas nepradėti žemės dirbimo.</i>	150 ml apdorojant 500 m ²		1

			Plotai prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varpučiai 10 cm aukščio, daugiametės dviskiltės - skrotelės stadijoje, pavasarį 5 dienos prieš sėją, sodinimą. <i>Nepurkšti šalną metu!</i>	100 ml apdorojant 500 m ²		1	
4.	Ecoplug AB Ecplug Sweden 0406H/11 2020-03-04	Glifosatas 204 g kapsulėje	Nepageidaujamų medžių ir krūmų atželimui stabdyti ir kelmų ir šaknų	Išgręžti šviežiai nupjautame kelme skyles, įkalti kapsules, atsižvelgiant į kelmo diametrą			1	
5.	Fenix Bayer CropScience AG, 0305H/07, 2012-12-31	Aklonifenas 600 g/l	Bulvės	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės. Purškama po paskutinio bulvių kaupimo, bet ne vėliau kaip 1 savaitė iki bulvių daigų pasirodymo	30 ml/a		1	
			Žirniai, pupos	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės. Purškama iš karto po sėjos, prieš sudygstant žirniams ar pupoms	30 ml/a		1	
			Morkos, šakniniai salierai,	Vienametės dviskiltės ir kai kurios	25 ml/a		2	

			pastarnokai, šakninės petražolės	vienaskiltės. Purškiant vieną kartą: prieš sudygimą. Purškiant per du kartus: pirmą kartą prieš sudygstant pasėliams 15 ml/a, antrą kartą purškiama sudygus daržovių pasėliams, kai daržovės turi 2 tikruosius lapelius, o piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje 10 ml/a				
			Svogūnai, sodinami iš ropelių, česnakai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės. Purškiant vieną kartą: prieš sudygimą. Purškiant per du kartus: pirmą kartą iškart po svogūnų pasodinimo 15 ml/a, antrą kartą purškiama sudygus daržovių pasėliams, kai daržovės turi 1-2 lapelius, o piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje 10 ml/a	25 ml/a		2	
6.	Glyfos Bio 360 SL	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių pomedžiai	Naikina vienmetes ir	150 ml 10 l vandens,		1	

Cheminova A/S, 0294H/06, 2016-03-25			daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį. Purškiant saugoti, kad herbicidas nepatektų ant vaismedžių žaliųjų dalių	apdorojant 500 m ²			
	Plotai, skirti sodams ir uogynams veisti		Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai išsprogsta 3–4 lapai arba kai išauga iki 10–12 cm aukščio	150–200 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
	Plotai, skirti kitų metų augalams auginti		Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės po derliaus nuėmimo: varpučiui esant 10–20 cm aukščio, usnims ir	150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	

				kitoms daugiametėms plačialapėms piktžolėms – skrotelės tarpsnyje				
			Plotai, prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Naikina vienmetes ir daugiames vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varputis yra 10 cm aukščio, daugiametės plačialapės piktžolės – skrotelės stadijos	120 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²	5		
			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu	1 dalis Glyfos Bio 360 SL ir 3 dalys vandens (1:3)			
7.	Glyfos 360 SL Cheminova A/S, 0095H/06, 2016-03-25	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių pomedžiai	Naikina vienmetes ir daugiames vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį. Purškiant saugoti, kad herbicidas nepatektų ant vaismedžių žaliųjų dalių	150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	

			Plotai, skirti sodams ir uogynams veisti	Naikina vienmetes ir daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai išsprogsta 3–4 lapai arba kai išauga iki 10–12 cm aukščio	150–200 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai, skirti kitų metų augalams auginti	Naikina vienmetes ir daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės po derliaus nuėmimo: varpučiui esant 10–20 cm aukščio, usnims ir kitoms daugiametėms plačialapėms piktžolėms – skrotelės tarpsnyje	150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai, prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Naikina vienmetes ir daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai	120 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²	5		

				varputis yra 10 cm aukščio, daugiametės plačialapės piktžolės – skrotelės stadijos			
			Gėlynai, vejės	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu	1 dalis Glyfos 360 SL ir 3 dalys vandens (1:3)		
8.	Glyfos Bio 450 SL Cheminova A/S, 0295H/06, 2016-03-25	Glifosatas 450 g/l	Vaismedžių pomedžiai	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį. Purškiant saugoti, kad herbicidas nepatektų ant vaismedžių žaliųjų dalių	120 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1
			Plotai, skirti sodams ir uogynams veisti	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai išsprogsta 3–4 lapai arba kai išauga iki 10–12 cm aukščio	120–160 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1

			Plotai, skirti kitų metų augalams auginti	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės po derliaus nuėmimo: varpučiui esant 10–20 cm aukščio, usnims ir kitoms daugiametėms plačialapėms piktžolėms – skrotelės tarpsnyje	120 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai, prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varputis yra 10 cm aukščio, daugiametės plačialapės piktžolės – skrotelės stadijos	100 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²	5	1	
			Gėlynai, vejės	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu	1 dalis Glyfos Bio 450 SL ir 4 dalys vandens (1:4)			
9.	Glyfos supreme 450	Glifosatas 450 g/l	Vaismedžių pomedžiai	Naikina vienmetes ir	120 ml 10 l vandens,		1	

	SL Cheminova A/S, 0338H/07, 2017-12-17			daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarij, vasarą arba rudenij. Purškiant saugoti, kad herbicidas nepatektų ant vaismedžių žaliųjų dalių	apdorojant 500 m ²				
				Plotai, skirti sodams ir uogynams veisti	Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai išsprogsta 3–4 lapai arba kai išauga iki 10–12 cm aukščio	120–160 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
				Plotai, skirti kitų metų augalams auginti	Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės po derliaus nuėmimo: varpučiui esant 10–20 cm aukščio, usnims ir	120 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	

				kitoms daugiametėms plačialapėms piktžolėms – skrotelės tarpsnyje				
			Gėlynai, vejės	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu	1 dalis Glyfos supreme 450 SL ir 4 dalys vandens (1:4)			
			Plotai, prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Naikina vienmetes ir daugiames vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varputis yra 10 cm aukščio, daugiametės plačialapės piktžolės – skrotelės stadijos	100 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²	5	1	
10.	Glyphomax Dow AgroSciences Danmark A/S, 0199H/06, 2016-03-16	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių, uogakrūmių pomedžiai	Naikina daugiames ir vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius ir uogakrūmius	150 ml apdorojant 500 m ²		1	

			Plotai, skirti sodų ir uogynų įveisimui	Naikina daugiameses ir vienmeses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai jos turi 3-4 lapus arba yra 10-12 cm aukščio	150 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. <i>Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų.</i>	1 dalis Glifomakso ir 3 dalys vandens		1	
			Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Purškama po derliaus nuėmimo. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai varpučiai 10-20 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiamesės dviskiltės - skrotelės stadijoje	150 ml apdorojant 500 m ²		1	

			Plotai prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varpučiai 10 cm aukščio, daugiametės dviskiltės - skrotelės stadijoje, pavasarį 5 dienos prieš sėją, sodinimą. <i>Nepurkšti šalną metu!</i>	100 ml apdorojant 500 m ²		1	
11.	MCPA 750 Nufarm GmbH&Co KG 0116H/03, 2020-02-08	MCPA 750 g/l	Vejos	Naikina vienametes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles. Purškama, kai kiaušpienės yra pilnos rozetės stadijoje, bet prieš žiedinio pumpuro susidarymą, kai vejoje vyrauja herbicidui jautrios piktžolės	70 ml/ 10 litrų vandens, nupurškiant 300m ² vejos		1	
12.	Kernel 480 SL Cheminova A/S, 0296H/06, 2016-03-25	Glifosatas 480 g/l	Vaismedžių pomedžiai	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiant saugoti, kad herbicidas nepatektų ant vaismedžių ir uogakrūmių žaliųjų dalių	113 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
			Plotais, skirti vaismedžiams ir	Naikina vienmetes ir	113–150 ml 10 l		1	

			uogynams veisti	daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai išsprogsta 3–4 lapai arba kai jos išauga iki 10–12 cm aukščio	vandens, apdorojant 500 m ²			
			Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai išsprogsta 3–4 lapai arba kai jos išauga iki 10–12 cm aukščio	113-150 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai prieš bulvių kopūstų sodinimą, morkų sėją	Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varputis yra 10 cm aukščio, daugiametės plačialapės piktžolės – skrotelės stadijos	90 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²	5	1	
			Gėlynai, vejose	Aukštaūgės piktžolės naikinamos	1 dalis Kernel 480 SL ir 4			

				pavasarij arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu	dalys vandens (1:4)			
13.	Klinik 360 SL Nufarm GmbH&Co KG 0233H/06 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	Plotai kitų metų augalams auginti, plotai, skirtiems vaismedžiams ir uogakrūmiams įveisti	Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti piktžolių aktyvaus augimo metu pavasarij, vasarą arba rudenį.	150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ² .			Žemę galima pradėti dirbti 10 dienų po purškimo
			Vaismedžių ir uogakrūmių pomedžiai	Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių ir uogakrūmių dalis, aktyvaus jų augimo metu pavasarij, vasarą arba rudenį.	150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ² .			
			Gėlynai, vejos	Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Tepti aukštaūges piktžoles jų	1 dalis Klinik 360 SL ir 3 dalys vandens			

				aktyvaus augimo metu pavasarį arba vasarą. Tepant šepetėliai turi būtine žemiau kaip 10 cm iki kultūrinių augalų viršūnių.			
14.	Nufarm MCPA Nufarm GmbH&Co KG 0064H/10 2020-02-08	MCPA 750 g/l	Vejos	Naikina vienmetes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles. Purkšti jaunas, aktyviai augančias piktžoles	70 ml/ 10 litrų vandens, nupurškiant 300m ² vejos		1
15.	Ouragan with system 4 Syngenta Ltd., 0244H/06, 2016-03-04	Glifosatas 360 g/l	Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Naikina daugiameses ir vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1
			Vaismedžių pomedžiai	Naikina daugiameses ir vienameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1
			Bulvės iki sudygimo	Naikina daugiameses ir vienameses vienaskiltes ir dviskiltes	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1

				piktžolės. Purškiamos vegetuojančios piktžolės 2-3 dienos iki bulvių sudygimo			
			Plotai iki grikių sėjos	Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžolės. Purškiamos vegetuojančios piktžolės iki grikių sėjos	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1
16.	Ranger Monsanto Crop Science, Denmark A/S, 0234H/06, 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių, uogakrūmių pomedžiai	Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžolės. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarij, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius ir uogakrūmius	150 ml apdorojant 500 m ²		1
			Plotai, skirti sodų ir uogynų įveisimui	Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžolės. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai jos turi 3-4 lapus arba yra 10-12 cm aukščio	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1

			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. <i>Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų.</i>	1 dalis Ranger ir 3 dalys vandens		1	
			Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Purškiama o derliaus nuėmimo. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai varpučiai 10-20 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiametės dviskiltės - skrotelės stadijoje. <i>Po purškimo 5 dienas nepradėti žemės dirbimo.</i>	150 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varpučiai 10 cm aukščio, daugiametės dviskiltės - skrotelės stadijoje, pavasarį 5 dienos prieš sėją, sodinimą. <i>Nepurkšti šalų metu!</i>	100 ml apdorojant 500 m ²		1	
17.	Rodeo Monsanto Crop Science Denmark A/S,	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių, uogakrūmių pomedžiai	Naikina daugiabetes ir vienabetes ir vienaskiltės ir	150 ml apdorojant 500 m ²		1	

0184H/06, 2016-02-09				dviskiltes piktžolės. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius ir uogakrūmius			
		Plotai, skirti sodų ir uogynų įveisimui		Naikina daugiameses ir vienameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžolės. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai jos turi 3-4 lapus arba yra 10-12 cm aukščio	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1
		Gėlynai, vejose		Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. <i>Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų.</i>	1 dalis Rodeo ir 3 dalys vandens		1
		Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui		Purškiama o derliaus nuėmimo. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai varpučiai 10-20 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiamesės	150 ml apdorojant 500 m ²		1

				dviskiltės - skrotelės stadijoje. <i>Po purškimo 5 dienas nepradėti žemės dirbimo.</i>			
			Plotai prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varpučiai 10 cm aukščio, daugiametės dviskiltės - skrotelės stadijoje, pavasarį 5 dienos prieš sėją, sodinimą. <i>Nepurkšti šalų metu!</i>	100 ml apdorojant 500 m ²		1
18.	Roundup Classic Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0013H/06, 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių, uogakrūmių pomedžiai	Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius ir uogakrūmius	150 ml apdorojant 500 m ²		1
			Plotai, skirti sodų ir uogynų įveisimui	Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1

				piktžolės, kai jos turi 3-4 lapus arba yra 10-12 cm aukščio				
			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. <i>Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų.</i>	1 dalis Roundup Classic ir 3 dalys vandens			1
			Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Purškama o derliaus nuėmimo. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai varpučiai 10-20 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiametės dviskiltės - skrotelės stadijoje. <i>Po purškimo 5 dienas nepradėti žemės dirbimo.</i>	150 ml apdorojant 500 m ²			1
			Plotai prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varpučiai 10 cm aukščio, daugiametės dviskiltės - skrotelės stadijoje, pavasarį 5 dienos prieš sėją, sodinimą. <i>Nepurkšti šalną metu!</i>	100 ml apdorojant 500 m ²			1

19.	Roundup Bio Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0173H/06, 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių, uogakrūmių pomedžiai	Naikina daugiameses ir vienmeses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius ir uogakrūmius	150 ml apdorojant 500 m ²	1
			Plotai, skirti sodų ir uogynų įveisimui	Naikina daugiameses ir vienameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai jos turi 3-4 lapus arba yra 10-12 cm aukščio	150-200 ml apdorojant 500 m ²	1
			Gėlynai, vejose	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. <i>Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų.</i>	1 dalis Roundup Bio ir 3 dalys vandens	1
			Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Purškiama o derliaus nuėmimo. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai	150 ml apdorojant 500 m ²	1

				varpučiai 10-20 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiametės dviskiltės - skrotelės stadijoje. <i>Po purškimo 5 dienas nepradėti žemės dirbimo.</i>			
			Plotai prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varpučiai 10 cm aukščio, daugiametės dviskiltės - skrotelės stadijoje, pavasarį 5 dienos prieš sėją, sodinimą. <i>Nepurkšti šalų metu!</i>	100 ml apdorojant 500 m ²		1
20.	Roundup Gold Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0245H/06, 2016-02-09	Glifosatas 450 g/l	Vaismedžių ir uogakrūmių pomedžiai	Naikina daugiameses ir vienmeses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos piktžolės aktyvaus augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius ir uogakrūmius	120 ml apdorojant 500 m ²		1
			Plotai, skirti vaismedžiams ir uogynams veisti	Naikina daugiameses ir vienmeses vienaskiltes ir dviskiltes	120 ml apdorojant 500 m ²		1

				piktžolės. Purškiamos piktžolės aktyvaus augimo metu, kai jos turi 3–4 lapus arba yra 10-12 cm aukščio			
			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarij arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. <i>Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų!</i>	1 dalis Roundup Gold ir 3 dalys vandens		1
			Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Naikina daugiametes ir vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžolės. Purškama po derliaus nuėmimo piktžolių aktyvaus augimo metu, kai varpučiai 10-20 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiametės dviskiltės - skrotelės stadijoje. <i>Po purškimo 5 dienas nepradėti žemės dirbimo.</i>	120 ml apdorojant 500 m ²		1
			Plotai prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Naikina daugiametes ir vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžolės. Purškiamos	80 ml apdorojant 500 m ²		1

				vegetuojančios piktžolės, kai varpučiai 10 cm aukščio, daugiametės dviskiltės - skrotelės stadijoje, pavasarį 5 dienos prieš sėją, sodinimą. <i>Nepurkšti šalną metu!</i>			
21.	Starane 180 Dow AgroSciences Danmark A/S, 0143H/04, 2011-12-31	Fluroksipiras 180 g/l	Vejos	Naikina rūgštynes, dilgėles, kiaulpienes trikertes žvagines, dirvines nemiršėles, daržines žliūges, gysločius, vėdrynus. Purškiama, kai piktžolės aktyviai auga.	15-20 ml/100 m ² tirpalo norma - 2-4 l m ² vejos		2
22.	Taifun B Feinchemie Schwebda GmbH, 0261H/06, 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių (obelų, kriaušių) pomedžiai	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės ir dviskiltės. Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga pavasarį, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius	200 ml apdorojant 500 m ²		1
			Plotai, skirti sodams ir uogynams įveisti	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės ir dviskiltės. Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga, turi 3-4 lapelius arba yra 10-12 cm	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1

				aukščio				
			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. <i>Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų!</i>	1 dalis Taifun ir 3 dalys vandens			Aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm iki kultūrinių augalų viršūnių. <i>Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų!</i>
			Plotai skirti kitų metų augalų auginimui	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės ir dviskiltės. Purkšti po derliaus nuėmimo, kai piktžolės aktyviai auga, t.y. varpučiai yra 10-12 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiametės piktžolės skrotelės tarsnyje	150 ml apdorojant 500 m ²		1	

Repelentai

1. Plantskydd Gyllebo Godning AB 0329R/07 2012-12-31	Kraujo miltai 99%	Lapuočių, spygliuočių sodinukai, dekoratyviniai augalai	Apsaugo nuo kiškių, stirnų, elnių ir briedžių apgraužimo	1,1 kg 1000 augalų. Augalai apipurškiami arba aptepami nuo rugsėjo iki kovo mėn.
--	----------------------	---	--	---